

NOTE XXXI.

FAUNA SIMALURENSIS.
COLEOPTERA, FAM. CICINDELIDAE

VON

Dr. WALTHER HORN.

1. *Collyris celebensis* Chaud.

- 1 Exemplar (n^o. 2859) von Pulu Babi, April 1913.
3 Exemplare (n^{os}. 992, 1077 und 2860) von Sinabang (Simalur), Februar 1913.

2. *Cicindela speculifera brevipennis* W. Horn.

- 22 Exemplare von Sinabang und Lasikin (Simalur),
Februar, März, Mai und Juni 1913.

3. *Cicindela discreta* Schaum.

- 8 Exemplare (n^{os}. 1103, 1104, 1106, 1111, 1148, 1149,
1150 und 3745) von Sinabang (Simalur), Januar,
Februar und Juli 1913.

4. *Cicindela Jacobsoni* W. Horn, nov. spec. ♀.

- 2 Exemplare (n^{os}. 2756 und 2758) von Lasikin (Simalur), April 1913.
1 Exemplar (n^o. 3743) von Labuan Badjang (Simalur),
Juni 1913.

Trochanteribus anticis pila fixata ornatis, trochanteribus intermediis nudis. Capite toto, prosterno, pronoto nudis; pro-episternis fere nudis (solummodo intus sparsissime setosis); meta-episternis cum parte adjacente metasterni

Notes from the Leyden Museum, Vol. XXXV.

partequae laterali coxarum posticarum, abdominis lateribus et partibus centralibus (his brevissime) pilosis. Antennarum articulo primo (nudo), femoribus 4 primis aut omnibus maxima ex parte testaceis. Labro, palpis (non inflatis), trochanteribus coxisque testaceis. — Long. 8 mm (sine labro).

In collectione auctoris et Dr. Veth.

Cicindela discretæ Schm. similis, differt labro medio magis producto, 4 setoso; fronte inter oculos profundius excavata; vertice paullo longiore et angustiore; pronoto paullo longiore angustiore (præcipue antice), lateribus paullo minus rectis (antice posticeque paullo magis constricto), disco discrete subtilissime densissime transversim striolato; elytris evidententer angustioribus, sine plagis velutinis, spina suturali obtusissima; lunula humerali multo longiore posticeque crassiore, macula marginali media majore obliqua (discum et posticem versus descendente: lateraliter non dilatata, discum non attingente), puncto discoidali nullo, macula ante-apicali majore virguliformi (antice incrassata) margini magis approximata cum linea apicali marginali connata aut fere connata. Antennarum articulo 2.—4. testaceo-cyaneis; tibiis tarsisque testaceis aut plus minusve cyaneo-indutis; femoribus posticis testaceis aut in medio et distaliter cyaneis; femoribus 4 anticis leviter cyaneo-indutis.

Diese auf der nahe der Nordwest-Ecke von Sumatra gelegenen Insel Simalur vorkommende Art ähnelt in manchem der *Cic. discreta*. Pronotum vorn und hinten gleichmässig eingeschnürt. Oberseite des ganzen Tieres mehr kupfrig-bräunlich, Kopf und Halsschild unten mehr messingfarben, Rest der Unterseite entweder changierend kupfrig-violett oder mehr grünlich erzfarben. Flügeldecken Grübchen auf dem bräunlichen Ton im allgemeinen etwas besser sichtbar als dort. Spiegelfleck der ♀♀ gross, mässig glänzend, kupfrig. Wegen der Schmalheit erscheinen die Flügeldecken weniger abgeflacht.

5. *Cicindela funerea opigrapha* Dej.

1 Exemplar (n^o. 4750) von Sibigo (Simalur), August 1913.

Notes from the Leyden Museum, Vol. XXXV.

6. *Cicindela didyma* Dej.

6 Exemplare (n^{os}. 1112, 1113, 1286, 1289—1291)
von Sinabang (Simalur), Januar und Februar 1913.

Die blauen und grünen Töne der Ober- und Unterseite sowie der Schenkel treten mehr zurück, dafür dominieren kupfrige. Die Makeln der Flügeldecken sind etwas vergrößert und der Scheibenfleck mit der Mittelrandmakel verbunden.

7. *Cicindela longipes* F.

25 Exemplare von Lasikin (Simalur), März und April 1913.

Berlin-Dahlem, December 1913.